









SCORE	0	1	2	3
Rectale temperatuur(°C)	< 38.5	38.5-39.0	39.0-39.5	> 39.5
Hoest	Geen	Enkelvoudige hoest (ev. na palperen luchtpijp)	- Frequentere spontane hoest - Herhaalde hoest na palpatie luchtpijp	- Spontaan, herhaaldelijk hoesten
Neusvloeï	Normaal (licht sereus) 	- Overvloedig sereus of - Éénzijdig spoor etter 	- Bilateraal spoortje etter - Overvloedig muceus 	Bilateraal, overvloedig en mucopurulent 
Gedrag	Normaal 	Matige depressie (blijft langer neerliggen dan anderen) 	Ligt veel neer, apart van andere dieren, depressie 	Ernstige depressie, weigert op te staan 

- Alle 4 de parameters scoren
- Score optellen
- Totale score=
 - $< 4 \rightarrow$ geen behandeling
 - $4 \rightarrow$ observeren en herevalueren volgende voeding
 - $>4 \rightarrow$ behandelen
- Te gebruiken medicatie steeds op advies van de dierenarts

BRD individueel behandelingsprotocol

Initiële behandeling:
Evaluatie met scorekaart
- Antibiotica
- NSAID



Succesvolle
behandeling

Falen van de
behandeling
(Nieuwe behandeling op
advies dierenarts)



Falen van de
behandeling
Verhuizen naar
'hospitalisatiestal'



Euthanasie
BVDV test
3^{de} behandeling

