

## **Aanbevelingen voor vleeskalverhouders bij de toepassing van antibiotica**

### **1. Persoonlijke veiligheid**

1. Draag bij het gebruik/doseren van antibiotica altijd wegwerphandschoenen.
2. Draag bij de toediening/dosering van antibiotica in poedervorm altijd een schoon mondkapje. Advies is om mondkapje met nummer FFP 2 te dragen.
3. Draag bij het gebruik van antibiotica altijd een overall. Gebruik na afloop van de kuur een schone overall. Was de gebruikte overall op ten minste 60°C.
4. Probeer bij het gebruik van antibiotica in poedervorm het verstuiven van antibiotica zo veel mogelijk te voorkomen.
5. Maak de plaats van afwegen na gebruik schoon met overvloedig water.
6. Was na de toediening van antibiotica/de voerbeurt de handen met zeep en ruim water.
7. Maak gebruik van papieren handdoekjes voor het afdrogen van de handen

### **2. Voorkomen van versleping**

1. Gebruik voor het afwegen van antibiotica een weegschaal met een afweegbakje dat goed te reinigen is. Reinig dit bakje na iedere antibioticakuur met water en zeep.
2. Reinig de emmers/kannen en andere materialen (bijv. gardes) waarin/-mee het antibioticum wordt opgelost, na ieder gebruik met water en zeep.
3. Houd de plaats van afwegen schoon.
4. Spoel het melkleidingsysteem na elke voerbeurt eerst met lauw water, vervolgens met warm water (>60°C) en zet het weg met koud water. Gebruik het koude water bij een volgende voerbeurt niet.
5. Reinig (met een alkalisch-, gevolgd door een zuur reinigingsmiddel) de medicijnmenger inclusief de overstortleiding naar de aanmaakmenger na iedere antibioticumkuur en gebruik daar waar mogelijk een harde borstel voor de reiniging.
6. Reinig het melkleidingsysteem na afronding van een kuur en realiseer daarbij een circulatie reiniging waarbij alle leidingen in een circuit worden meegenomen in de reiniging.